

PATIENT

Collez Etiquette

Nom
Prénom
Date de naissance
IPP

LABORATOIRE

Collez
Etiquette
1

Collez
Etiquette
2

IDENTITE

PRESCRIPTEUR :

VISA :

PRELEVEUR :

DATE :

HEURE DE PRELEVEMENT :

H

Min

CONTEXTE : ☐ Immunodépression_(ID) ☐ Diabète_(DIA) ☐ Grossesse_(GRO)

ANTIBIOTIQUES

ANTIBIOTIQUE(S) : ☐ Non _(N) ☐ Oui AVANT_(OA) ☐ Oui APRES_(OP) ☐ Oui AVANT et APRES_(OAP) ☐ Non renseigné _(NR)

SI OUI, LEQUEL(S) :

- | | | | | |
|--|---|--|---|--|
| ☐ Amphotéricine | ☐ Acide Fusidique _(Fucidine) | ☐ Amikacine | ☐ Amoxicilline _(Clamoxyl) | ☐ Amox. + Ac. Clav _(Augmentin) |
| ☐ Céfixime _(Oroken) | ☐ Azithromycine _(Zithromax) | ☐ Aztréonam _(Azactam) | ☐ Caspofungine _(Cancidas) | ☐ Céfazoline |
| ☐ Ceftazidime _(Fortum) | ☐ Céfotaxime | ☐ Cefoxitine _(Mefoxin) | ☐ Cefpodoxime _(Orelax) | ☐ Ceftaroline _(Zinforo) |
| ☐ Cefuroxime _(Zinnat) | ☐ Cefta + Avibactam _(Zavicefta) | ☐ Ceftolozane + Tazo _(Zerbaxa) | ☐ Ceftobiprole _(Mabelio) | ☐ Ceftriaxone _(Rocephin) |
| ☐ Colistine | ☐ Ciprofloxacine _(Ciflox) | ☐ Clarithromycine _(Zeclar) | ☐ Clindamycine _(Dalacine) | ☐ Cloxacilline _(Orbénine) |
| ☐ Erythromycine | ☐ Cotrimoxazole _(Bactrim) | ☐ Daptomycine _(Cubicin) | ☐ Doxycycline _(Doxyl) | ☐ Ertapénème _(Invanz) |
| ☐ Imipénème _(Tienam) | ☐ Fidaxomicine _(Dificilr) | ☐ Fosfomycine _(Monuril) | ☐ Fluconazole _(Triflucan) | ☐ Gentamicine |
| ☐ Mecillinam _(Selextid) | ☐ Itraconazole _(Sporanox) | ☐ Lévofloxacine _(Tavanic) | ☐ Lincomycine _(Lincocine) | ☐ Linézolide _(Zyvoxid) |
| ☐ Nitrofuranes _(Furadantine) | ☐ Méropénème _(Meronom) | ☐ Métronidazole _(Flagyl) | ☐ Micafungine | ☐ Moxifloxacine _(Izilox) |
| ☐ Piperacilline | ☐ Norfloxacine _(Noroxine) | ☐ Ofloxacine _(Ofloctet) | ☐ Oxacilline _(Bristopen) | ☐ Pénicilline |
| ☐ Teicoplanine _(Targocid) | ☐ Piper + Tazo _(Tazocilline) | ☐ Pristinamycine _(Pyostacine) | ☐ Rifampicine | ☐ Spiramycine |
| ☐ Trimethoprim _(Delprim) | ☐ Temocilline _(Negaban) | ☐ Ticar. + Ac. Clav _(Timentin) | ☐ Tigécycline _(Tygacil) | ☐ Tobramycine _(Tobi) |
| ☐ Trimethoprim + Sulf. _(Bactrim) | ☐ Vancomycine | ☐ Vancomycine | ☐ Voriconazole _(Vfend) | |

Autre (précisez svp) : _____

HEMOCULTURES

Hémoculture N°1 (1^{ère} Paire) : 1. Préciser type (cocher 1 seule case) : ☐ Standard _(HEM1) ☐ Endocardite _(ENDO1)2. Préciser localisation : ☐ Accès veineux direct _(VEI) ☐ KT Artériel _(KTA) ☐ KT Veineux périphérique _(KTP) ☐ KT Veineux central _(KTC)
☐ KT Dialyse _(KTD) ☐ KT Picc-Line _(KTP) ☐ Port-à-cath _(PAC) ☐ Autre : _____Hémoculture N°2 (2^{ème} Paire) : 1. Préciser type (cocher 1 seule case) : ☐ Standard _(HEM2) ☐ Endocardite _(ENDO2)2. Préciser localisation : ☐ Accès veineux direct _(VEI) ☐ KT Artériel _(KTA) ☐ KT Veineux périphérique _(KTP) ☐ KT Veineux central _(KTC)
☐ KT Dialyse _(KTD) ☐ KT Picc-Line _(KTP) ☐ Port-à-cath _(PAC) ☐ Autre : _____Hémoculture N°3 (3^{ème} Paire) : 1. Préciser type (cocher 1 seule case) : ☐ Standard _(HEM3) ☐ Endocardite _(ENDO3)2. Préciser localisation : ☐ Accès veineux direct _(VEI) ☐ KT Artériel _(KTA) ☐ KT Veineux périphérique _(KTP) ☐ KT Veineux central _(KTC)
☐ KT Dialyse _(KTD) ☐ KT Picc-Line _(KTP) ☐ Port-à-cath _(PAC) ☐ Autre : _____

URINES

ECBU : (cocher le type de prélèvement)

- | | | |
|--|--|--|
| ☐ Standard (milieu du jet) _(ECBU) | ☐ Sur sonde (à demeure) _(ECBUS) | ☐ Par sondage évacuateur « Aller/Retour » _(ECBU) |
| ☐ Collecteur Penien _(ECBU) | ☐ Cathéter Urétéral Rein Droit _(REIN1) | ☐ Cathéter Urétéral Rein Gauche _(REIN2) |
| ☐ Ponction vésicale sus-pubienne _(REIN1) | ☐ Stomie urinaire _(CBU) | ☐ Autre : _____ |

AUTRES :

- | | | | |
|--|--|---|---|
| ☐ Ag Legionella _(LEGU) | ☐ Ag Pneumocoque _(PNEU) | ☐ Chlamydia _(UCHLA) | ☐ Gonocoque _(UGONO) |
| ☐ Mycoplasmes _(UMYC) | ☐ Mycobactérium tuberculosis _(ENVOI) | ☐ Autre : _____ | |

PNEUMO

Standard : ☐ Expectorations _(EXP) ☐ Aspiration _(ASPI) ☐ LBA _(LBA) ☐ Prélèvement Distal Protégé _(PDP) (Brossage bronchique / Cathéter Distal Protégé)☐ Cocher si mucoviscidose _(+M) : Recherche Burkholderia cepacia,...

- | | | | |
|--|--|--|---|
| ☐ Spécifique : ☐ Nocardia _(NOCAR) | ☐ Actinomyces _(ACTIN) | ☐ Aspergillus _(ASPEC) | ☐ Pseudomonas _(BASP) |
| ☐ Mycoplasma pneumoniae _(MPNEU) | ☐ Chlamydia pneumoniae _(CPNEU) | ☐ Legionella _(LPNEU) | ☐ Coqueluche _(COQUE) |
| ☐ Grippe _(GRIPV) | ☐ VRS _(RSV) | ☐ PCR Biologie Syndromique sur ordonnance dédiée (Respi/pneumo) | |
| ☐ Mycob. tuberculosis Culture _(ENVOI) | ☐ Mycobac. atypiques Culture _(ENVOI) | ☐ Abscès Poumon _(PUS1) | ☐ Liquide pleural _(LPL) |
| ☐ Mycob. tuberculosis PCR _(BKPCR) | ☐ Mycobac. atypiques PCR _(ENVOI) | ☐ Pneumocystis _(ENVOI) | |

ORL/OEIL			
ORL : ☐ Gorge (<i>GOR</i>) ☐ Gonocoque Gorge (<i>DGONO</i>) ☐ Conduit auditif externe D (<i>OREI</i>) ☐ Narine droite (<i>NEZ</i>)	☐ Phlegmon Amygdale (<i>PUS1</i>) ☐ Herpes (<i>HERP</i>) ☐ Conduit auditif externe G (<i>OREI</i>) ☐ Narine gauche (<i>NEZ</i>)	☐ Langue (<i>LANG</i>) ☐ Syphilis (<i>SYPHP</i>) ☐ Oreille moyenne D (<i>PUS1</i>) ☐ Pus Profond ORL (<i>sinus,abcès...</i>) (<i>PUS1</i>)	☐ Bouche (<i>BUC</i>) ☐ Chlamydia (<i>DCHLA</i>) ☐ Oreille moyenne G (<i>PUS2</i>) préciser : _____
OEIL : ☐ Conjonctivite OD (<i>OEIL</i>) ☐ Pus Profond Ophtalmo (<i>cornée, humeur...</i>) (<i>PUS1/2/3</i>)			
☐ Conjonctivite OG (<i>OEIL</i>) ☐ Chlamydia (<i>DCHLA</i>) ☐ Herpes (<i>HERP</i>)			

SELLES			
☐ Bactériologie standard (<i>COP</i>) ☐ Klebsiella oxycota (<i>KOXY</i>) ☐ Parasitologie standard (<i>PAR</i>)	☐ Clostridium difficile (<i>RCD</i>) ☐ Escherichia coli EPEC / EHEC / ETEC / EAEC / Shigatoxines (<i>ECOLI</i>) ☐ Cryptosporidies (<i>CRYPT</i>)	☐ Virologie (= Rotavirus - Norovirus - Adénovirus - Astrovirus - Sapovirus) (<i>VIROS</i>) ☐ Anguillule (<i>ANG</i>)	☐ Recherche de sang (<i>SGS</i>) ☐ Biopsie colique (<i>BIOP</i>)
☐ Voyage : _____ ☐ Aliments contaminants : _____ ☐ Epidémie : _____			

DEPISTAGE BMR / STAPHYLOCOQUE			
Rectal :	☐ BLSE (<i>BLSE</i>) Staphylococcus SARM (<i>METI R uniquement</i>) :	☐ EPC (<i>EPC</i>) ☐ Nasal (<i>SARM</i>) Staphylococcus aureus (<i>METI R + METI S</i>) :	☐ ERV / ERG (<i>ERV</i>) ☐ Aisselle (<i>SARM2</i>) ☐ Gorge (<i>SARM3</i>) ☐ Autre : _____
		☐ Aisselle (<i>STAP2</i>) ☐ Gorge (<i>STAP3</i>) ☐ Autre : _____	

NOUVEAUX NES			
☐ Liquide gastrique (<i>NNLG</i>) ☐ Oreille (<i>NNOR</i>)	☐ Placenta (<i>NNPL</i>) ☐ Nez (<i>NNNE</i>)	☐ Anus (<i>NNAN</i>) ☐ Autre(s) : _____	☐ Omphalite (<i>NNOM</i>)

GENITAUX			
Standard : ☐ Vagin NON grossesse (<i>PV</i>) ☐ Stérilet (<i>STER</i>) ☐ Bartholinite (<i>PUS1/2/3</i>) ☐ Liq. de Douglas (<i>PUS1/2/3</i>)	☐ Vagin grossesse (<i>PVG</i>) ☐ Urètre (<i>PUH</i>)/(PUF) ☐ Endocol (<i>PUS1/2/3</i>) ☐ Abcès* (<i>PUS1/2/3</i>)	☐ Vagin grossesse MAP/RPM ☐ Sperme (<i>SPERM</i>) ☐ Salpingite (<i>PUS1/2/3</i>) Préciser la LOCALISATION : _____	☐ Strepto B Rapide (<i>SBRAP</i>) ☐ Balanopréputial/Verge (<i>BALA</i>) ☐ Endométrite (<i>PUS1/2/3</i>)
Spécifique : ☐ Mycoplasmes Vaginal (<i>PVMYC</i>) ☐ Chlamydia* (<i>DCHLA</i>)			
☐ Mycoplasmes Urètre (<i>PUMYC</i>) ☐ Herpes* (<i>HERP</i>)			
☐ Mycoplasmes autres (<i>DMYC</i>): _____ ☐ Syphilis* (<i>SYPHP</i>) ☐ Chancre mou* (<i>DUCRP</i>) Préciser la LOCALISATION : _____			

MATERIEL			
☐ KT Veineux central (<i>CATH</i>) ☐ Picc-Line (<i>CATH</i>) ☐ Drain (<i>MAT</i>) ☐ Anneau gastrique (<i>MAT</i>)	☐ KT Veineux périphérique (<i>CATH</i>) ☐ Chambre implantable (<i>MAT</i>) ☐ Swan Ganz (<i>MAT</i>) ☐ Stérilet (<i>STER</i>)	☐ KT Artériel (<i>CATH</i>) ☐ Electrode Pacemaker (<i>MAT</i>) ☐ Sonde urinaire (<i>MAT</i>) ☐ Lentille (<i>MAT</i>)	☐ KT Dialyse (<i>CATH</i>) ☐ Redon (<i>MAT</i>) ☐ Sonde intubation (<i>MAT</i>) ☐ Liq. Conserv. Lentille (<i>MAT</i>)

LIQUIDE DE PONCTION	
Préciser type (cocher 1 seule case) : ☐ Standard	☐ Flacon hémoculture n°1 (Aérobique/Ped) (<i>LPFH1</i>)
☐ Liquide péritonéal (<i>LPER</i>)	☐ Flacon hémoculture n°2 (Anaérobique) (<i>LPFH2</i>) ☐ Liquide ascite (<i>LASC</i>) ☐ Liquide pleural (<i>LPL</i>) ☐ Liquide articulaire (<i>LAR</i>) ☐ Liquide péricardique (<i>LPKA</i>) ☐ LCR

PUS / PRELEVEMENT OPERATOIRE (<i>PUS1/ PUS2 / PUS3</i>)			
☐ Abcès de paroi (<i>ABC/PAR</i>) ☐ Abcès hépatique (<i>ABC/HEP</i>) ☐ Abcès marge anale (<i>ABC/MAR</i>) ☐ Abcès pelvien (<i>ABC/PEL</i>) ☐ Abcès poumon (<i>ABC/POU</i>) ☐ Abcès ovaire (<i>ABC/OVA</i>) ☐ Abcès autre* (<i>ABC/xxx</i>) ☐ Amputation* (<i>AMP/xxx</i>) ☐ Anneau gastrique (<i>POI/ANG</i>) ☐ Appendicite (<i>API/AP</i>) ☐ Bile/Cholécystite (<i>CHO/BIL</i>)	☐ Biopsie* (<i>BIO/xxx</i>) ☐ Brûlure* (<i>BRU/xxx</i>) ☐ Cellulite* (<i>CEL/xxx</i>) ☐ Cicatrice* (<i>CIC/xxx</i>) ☐ Collection abdominale (<i>CO/ABM</i>) ☐ Collection sous-cutanée (<i>CO/SCU</i>) ☐ Corps étranger* (<i>COE/xxx</i>) ☐ Cutané superficiel* (<i>Attention Code Enr CUT1/2/3</i>) ☐ Dermohypodermite* (<i>DH/xxx</i>) ☐ Diverticulite (<i>DIV/DIV</i>) ☐ Ecoulement* (<i>ECO/xxx</i>)	☐ Ecouil. Laparotomie (<i>ECO/LAP</i>) ☐ Erysipèle* (<i>ERS/xxx</i>) ☐ Escarre* (<i>ESC/xxx</i>) ☐ Fasciite* (<i>FAS/xxx</i>) ☐ Fistule* (<i>FST/xxx</i>) ☐ Ganglion* (<i>GA/xxx</i>) ☐ Hématome* (<i>HEM/xxx</i>) ☐ Hernie* (<i>HE/xxx</i>) ☐ Kyste sacrococcygien (<i>KYS/SCG</i>) ☐ Kyste (autre)* (<i>KYS/xxx</i>) ☐ Liquide de Drain (<i>LIQ/DRA</i>)	☐ Liquide de Lame (<i>LIQ/LAM</i>) ☐ Liquide de Redon (<i>LIQ/RED</i>) ☐ Liquide Pancréatique (<i>LIQ/PAN</i>) ☐ Mal perforant plantaire* (<i>MAP/xxx</i>) ☐ Morsure* (<i>MOR/xxx</i>) ☐ Panaris* (<i>PAN/xxx</i>) ☐ Péritonite (<i>PER/PER</i>) ☐ Phlegmon* (<i>PHL/xxx</i>) ☐ Plaie chirurgicale* (<i>PL2/xxx</i>) ☐ Plaie traumatique* (<i>PL3/xxx</i>) ☐ Ulcère* (<i>ULC/xxx</i>)
Si Autre ou *, préciser la LOCALISATION			

AUTRE(S) ANALYSE(S) / TEXTE LIBRE