

1

Recommandations



- Si possible avant l'instauration du traitement anti-infectieux
- Conseil Arrêt Anti-Infectieux : Voie Orale : 7 J / Voie Locale : 3 J
- Ne pas faire de toilette ou de traitement local
- Ne pas uriner dans les 2h qui précèdent les prélèvements urétraux
- Eviter la présence de sang dans le prélèvement - Ne pas réaliser de prélèvement pendant la période menstruelle au niveau vaginal

2

Renseignements



- Date/Heure
- Anti-Infectieux**
- Pathologies associées** : immunodépression, ...
- Signes cliniques**: fièvre, ...
- Localisation du prélèvement**

3

Hygiène



- Lavage des mains
- Friction Hydroalcoolique
- Port de gant

4

Prélèvement



- Prélever sur la même principe qu'un prélèvement standard en utilisant un **Enat**
- Si **Vésicules** : percer pour recueillir le liquide.
- Si **Chancres ou Ulcération** : prélever les sérosités par grattage léger au niveau de la base de l'ulcère
- Si **Écoulement** : le recueillir avec l'écouvillon
- A défaut de vésicules, d'ucération et d'écoulements : prélever les **régions érythémateuses**
- Ouvrir le tube, déposer l'écouvillon, le casser au niveau du point de rupture (ligne colorée), revisser le bouchon et agiter.

5

Identification

ETIQUETTE PATIENT	
Nom :	_____
Nom jeune fille :	_____
Prénom :	_____
Né(e) le :	__/__/__
Sexe	<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F

6

Transmission

< 24H

