

1

Recommandations



-Si possible avant l'instauration du traitement anti-infectieux

-Transport rapide au laboratoire

2

Renseignements



- Date/Heure
- Anti-Infectieux**
- Pathologies associées** :
néoplasies, maladies auto-immunes, ...
- Préciser les **recherches spécifiques**:
BK, Nocardia, Actinomyces, Aspergillus, ...

3

Hygiène Préleveur



- Lavage des mains
- Friction Hydroalcoolique
- Port de gant

4

Hygiène Patient



- Désinfection en 4 temps
- Selon le protocole de l'établissement

5

Prélèvement



Cathéters

- L'ablation est réalisée aseptiquement après désinfection cutanée
- Après ablation du cathéter, pour les **cathéters longs**, couper **5 cm de l'extrémité distale** et pour les **courts**, prendre la **totalité de la partie insérée** et la placer dans un flacon stérile
- S'il existe du pus au point d'insertion, le prélever avec un écouvillon Eswab (rose)

Chambre implantable, Drain, Redon, ...

- Après ablation (chirurgicale), transférer le matériel dans le flacon stérile

6

Identification

ETIQUETTE PATIENT	
Nom :	-----
Nom jeune fille :	-----
Prénom :	-----
Né(e) le :	__/__/__
Sexe	<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F

7

Transmission

