

1

Recommandations



-Si possible avant l'instauration du traitement anti-infectieux

2

Renseignements



- Date/Heure
- Anti-Infectieux
- Pathologies associées : immunodépression, ...
- Signes cliniques: ...

3

Hygiène



- Lavage des mains
- Friction Hydroalcoolique
- Port de gant
- Port de Masque

4

Prélèvement

- Ecouvillonner avec **1 Enat Nasopharyngé** selon la technique décrite en page 2.
- Ouvrir le tube, déposer l'écouvillon, le casser, revisser le bouchon pour fermer le tube et agiter.



5


Identification

ETIQUETTE PATIENT	
Nom :	_____
Nom jeune fille :	_____
Prénom :	_____
Né(e) le : __/__/__	Sexe ☐ M ☐ F

6

Transmission

< 24H





A Maintenir la tête du patient légèrement inclinée en arrière



B Insérer l'écouvillon dans la narine, le pousser délicatement le plus loin possible en suivant le plancher de la fosse nasale, parallèlement au palais



C Ecouvillonner l'épithélium des fosses nasales en réalisant des mouvements rotatifs pendant 15 secondes environ en grattant les parois du nasopharynx afin de recueillir des cellules



D Retirer lentement l'écouvillon. Il doit être recouvert de mucus. Réitérer sur l'autre narine avec le même écouvillon si nécessaire.