

1

Recommandations



-Si possible avant l'instauration du traitement anti-infectieux

-Conseil Arrêt Anti-Infectieux :

Voie Orale : 7 jours / Voie Locale : 3 jours / Chlamydia : 5 semaines

-Ne pas faire de toilette ou de traitement local

(crème, gels, savons ...) avant le prélèvement

-Ne pas réaliser pendant la période menstruelle

2

Renseignements



-Date/Heure

-**Anti-Infectieux**

-**Pathologies associées** : immunodépression

-**Signes cliniques**: Leucorrhées, IST, Inf. Génitale Haute (Salpingite, ...), Fièvre, DIU...

-Préciser les **recherches spécifiques**: Actinomyces, ...

3

Hygiène



-Lavage des mains

-Friction Hydroalcoolique

-Port de gant

4

Prélèvement

- Installer la patiente en position gynécologique sur le fauteuil à prélèvement.
- Mettre en place un spéculum à usage unique préalablement rincé à l'eau tiède :
 - **spéculum 25x90 (rouge)** chez la femme nullipare ou âgée
 - **spéculum 35x90 (vert)** chez la multipare
- Ecouvillonner avec **1 Eswab rose** le col utérin puis les parois vaginales (en priorité les éventuelles lésions, à défaut de la moitié inférieure du vagin jusqu'au vestibule et la vulve, et de l'exocol jusqu'au cul de sac vaginal) et recueillir des leucorrhées.
- Ouvrir le tube, déposer l'écouvillon, le casser au niveau du point de rupture (ligne colorée), revisser le bouchon pour fermer le tube et agiter.



5

Identification

ETIQUETTE PATIENT	
Nom :	_____
Nom jeune fille :	_____
Prénom :	_____
Né(e) le : ____/____/____	Sexe ☐ M ☐ F

6

Transmission

< 24H

