

## 1

### Recommandations



- Si possible avant l'instauration du traitement anti-infectieux
- Conseil Arrêt Anti-Infectieux :  
Voie Orale : 7 jours / Voie Locale : 3 jours / Chlamydia : 5 semaines
- Ne pas faire de toilette ou de traitement local  
(crème, gels, savons ...) avant le prélèvement
- Ne pas réaliser pendant la période menstruelle

## 2

### Renseignements



- Date/Heure
- Anti-Infectieux**
- Pathologies associées** : immunodépression
- Signes cliniques**: Leucorrhées, IST, Prurit, ...
- Préciser les **recherches spécifiques**:  
Herpes, Oxyures, ... → Prélèvements dédiés

## 3

### Hygiène



- Lavage des mains
- Friction Hydroalcoolique
- Port de gant

## 4

### Prélèvement

- Ecouvillonner avec **1 Eswab rose** les lésions vulvaires.
- Ouvrir le tube, déposer l'écouvillon, le casser au niveau du point de rupture (ligne colorée), revisser le bouchon pour fermer le tube et agiter.



## 5

### Identification

ETIQUETTE PATIENT	
Nom :	-----
Nom jeune fille :	-----
Prénom :	-----
Né(e) le : ___/___/___	Sexe <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F

## 6

### Transmission

< 24H

