

1

Recommandations



- Si possible avant l'instauration du traitement anti-infectieux
- Conseil Arrêt Anti-Infectieux : Voie Orale : 7 J/ Voie Locale : 3 J
- Ne pas faire de toilette de la zone à prélever

2

Renseignements



- Date/Heure
- **Anti-Infectieux**
- **Pathologies associées** : immunodépression, ...
- **Signes cliniques** : fièvre, otite externe, otite moyenne aiguë, otite chronique, piscine...
- Préciser les **recherches spécifiques** : Aspergillus, ...

3

Hygiène



- Lavage des mains
- Friction Hydroalcoolique
- Port de gant

4

Prélèvement

- Ecouillonner avec **1 Eswab Orange** le ou les conduit(s) auriculaire(s). A défaut ou si l'écoulement est important, utiliser un Eswab Rose.
-
- Ouvrir le tube, déposer l'écouvillon, le casser au niveau du point de rupture (ligne colorée), revisser le bouchon et agiter.



5

Identification

ETIQUETTE PATIENT	
Nom :	_____
Nom jeune fille :	_____
Prénom :	_____
Né(e) le : ____/____/____	Sexe ☐ M ☐ F

Indiquer s'il s'agit de
l'oreille droite ou
gauche

6

Transmission

