



CUTANE : ICONOGRAPHIE IMPETIGO

V1.0 30/06/2019

Rédacteur: Y. ROUQUET

Impétigo :

L'**impétigo** est une **infection bactérienne** de la peau. La bactérie responsable de l'impétigo est un staphylocoque doré et/ou un streptocoque. En France, 90 % des impétigos sont dus au **staphylocoque doré**. L'**impétigo** est fréquent chez les enfants de deux à cinq ans, peut survenir chez l'enfant plus grand, voire même chez l'adulte. Il est très contagieux. L'**impétigo** peut apparaître sous deux aspects :

L'impétigo croûteux : C'est la forme la plus commune d'impétigo de l'enfant. Les **lésions d'impétigo** se forment sur une peau saine ou au contraire sur des lésions cutanées pré-existantes qui s'infectent par grattage : on parle d'**impétiginisation des lésions**. Le plus souvent, l'impétigo apparaît d'abord autour des orifices (narines, bouche, anus). Mais il peut s'étendre rapidement au cuir chevelu et au reste du corps, par auto-contamination lors du grattage. Des vésicules naissent et se transforment rapidement en pustules contenant un liquide trouble (pus). Ces pustules se rompent facilement, laissent place à une érosion suintante ou sèchent et prennent un aspect croûteux. Les **croûtes de couleur jaunâtre** sont entourées d'un pourtour rouge, inflammatoire. Si les lésions sont multiples, elles peuvent se regrouper en placards plus étendus. L'enfant n'a pas de fièvre.

L'impétigo bulleux : Il s'agit de la forme observée chez le nourrisson. Les lésions d'**impétigo** surviennent le plus souvent sur le tronc, le périnée ou les extrémités des membres. Des bulles molles, transparentes, de un à deux centimètres et entourées d'un halo rouge se forment. Elles persistent pendant deux à trois jours, puis se rompent. L'**impétigo bulleux** peut être associé à un peu de fièvre, à une diarrhée et à une fatigue. Il est plus contagieux que l'impétigo croûteux.

