



CUTANE : ICONOGRAPHIE INTERTRIGO

V1.0 30/06/2019

Rédacteur: Y. ROUQUET

Intertrigo :

Le terme intertrigo (du latin inter : entre, tergo : je frotte) désigne une dermatose localisée aux **plis cutanés**. Tous les plis peuvent être atteints, de façon isolée ou associée, qu'ils soient **grands** (inguinaux, interfessier, axillaires, sous-mammaires) ou **petits** (interdigito-palmaires, interorteils, ombilic, rétro-auriculaires, commissures labiale, ombilic). Il s'agit d'un motif fréquent de consultation en dermatologie. Bien que le diagnostic positif d'intertrigo soit évident, le diagnostic étiologique peut s'avérer difficile car les lésions sont souvent modifiées par la macération et le frottement. Les étiologies sont nombreuses, dominées par les infections, en particulier mycosiques. Dans tous les cas, les caractéristiques physicochimiques propres aux plis (augmentation de la température locale et du taux d'humidité, macération, frottements) sont des facteurs favorisant l'inflammation et les surinfections.

Les causes:

INTERTRIGOS INFECTIEUX

Candida

Dermatophytes : Eczéma marginé de Hébra

Pityriasis versicolor

Erythrasma

Folliculites

INTERTRIGOS NON INFECTIEUX

Psoriasis

Dermite/eczéma séborrhéique (Une composante mycosique est également évoquée : Malassezia furfur, Pitysporium ovale)

Eczéma atopique (mais importance du staphylocoque doré)

Eczéma de contact (même remarque)

CAUSES RARES

Acanthosis nigricans

Maladie de Paget extramammaire

Histiocytose X

Pemphigus familial de Hailey-Hailey

