

1

Recommandations



-Si possible avant l'instauration du traitement anti-infectieux

-Conseil Arrêt Anti-Infectieux :

Voie Orale : 7 jours / Voie Locale : 3 jours

-Ne pas faire de toilette ou de traitement local

(crème, gels, savons ...) avant le prélèvement

2

Renseignements



-Date/Heure

-**Anti-Infectieux**

-**Pathologies associées** : immunodépression

-**Indication**: pré-opératoire, gîtes bactériens, furonculose, épidémie, ...

-**Localisation**: nez, anus, gorge, aisselle, ...

3

Hygiène



-Lavage des mains

-Friction Hydroalcoolique

-Port de gant

4

Prélèvement

- Ecouillonner avec **1 Eswab rose** au niveau de la localisation indiquée :
 - **Staphylococcus aureus** : nez, gorge, aisselle, ...
 - **SARM** : nez, gorge, aisselle, ...
 - **BLSE** : anus (Vérifier la présence de matières fécales sur l'écouvillon)
 - **BHR (EPC / ERV)** : anus (Vérifier la présence de matières fécales sur l'écouvillon)
- Ouvrir le tube, déposer l'écouvillon, le casser au niveau du point de rupture (ligne colorée), revisser le bouchon pour fermer le tube et agiter.



5

Identification

ETIQUETTE PATIENT	
Nom :	_____
Nom jeune fille :	_____
Prénom :	_____
Né(e) le : ____/____/____	Sexe ☐ M ☐ F



Indiquer :

la localisation sur l'écouvillon

6

Transmission

< 24H

