


1

Recommandations



-Si possible avant l'instauration du traitement anti-infectieux

-Conseil Arrêt Anti-Infectieux :

Voie Orale : 7 jours / Voie Locale : 3 jours / Chlamydia : 5 semaines

-Ne pas faire de toilette ou de traitement local

(crème, gels, savons ...) avant le prélèvement

2

Renseignements



-Date/Heure

-Anti-Infectieux

-Signes cliniques: Leucorrhées, IST, Fièvre, ...

La notion de MAP (Menace Accouchement Prématuro), RPM (Rupture Prématuro des Membranes) et RPDE (Rupture Prématuro de la Poche des Eaux) est capitale à renseigner.

3

Hygiène



-Lavage des mains

-Friction Hydroalcoolique

-Port de gant

4

Prélèvement



- Installer la patiente en position gynécologique sur le fauteuil à prélèvement.
- Ne pas utiliser de spéculum
- Ecouillonner avec **1 Eswab rose** les parois vaginales (de la moitié inférieure du vagin jusqu'au vestibule et la vulve, cul de sac vaginal) et recueillir les leucorrhées si présentes.
- Ouvrir le tube, déposer l'écouvillon, le casser au niveau du point de rupture (ligne colorée), revisser le bouchon pour fermer le tube et agiter.

5

Identification

ETIQUETTE PATIENT	
Nom :	_____
Nom jeune fille :	_____
Prénom :	_____
Né(e) le :	__/__/__ Sexe <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F

6

Transmission

< 24H

